



ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET National Institute of Oncology

Főigazgató Főorvos: *prof. dr. Polgár Csaba Ph.D., DSc.*,
☒ 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. ☎: (+36 1) 224 8600, Fax.1 224-8620 Web:www.oncol.hu

Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ

Központvezető főorvos: *Dr. med. habil. Tárnoki Dávid László PhD.*
Osztályvezető főorvos: *Dr. med. habil. Tárnoki Ádám Domonkos PhD.*
☎: (+36 1) 224-8758

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

ULTRAHANG VEZÉRELT BŐRÖN KERESZTÜLI ALKOHOLOS RONCSOLÁSOS MÓDSZERRŐL

Önnél betegségének kivizsgálása vagy követése során kóros eltérést találtak, melynek kezelése céljából irányították hozzánk. Kezelőorvosával részletesen meg kellett beszélnie a tervezett beavatkozás szükségességét, indokát és Önnek ismernie kell a kezelés menetét és esetleges szövődményeit.

Kezelőorvosával részletesen meg kell beszélnie a tervezett beavatkozás szükségességét, indokát és Önnek ismernie kell a vizsgálat menetét, esetleges szövődményeit. Kezelőorvosa kérésére, az **Ön tájékozott beleegyezésével** kerülhet csak sor a beavatkozásra.



Beavatkozás (megfelelő aláhúzendő): *Pajzsmirigy cysta, / túlnyomóan cystás göb, / Pajzsmirigy daganat áttéteinek* alkoholos kezelése.

Kinél jön szóba alkoholos kezelés?

Pajzsmirigy cysták (jóindulatú, folyadékkal telt hólyagok) vagy túlnyomóan cystás pajzsmirigygöbök esetében. Továbbá pajzsmirigy daganat kiújulása vagy nyaki nyirokcsomó áttét esetén, amennyiben a sebészi kezelés nem lehetséges, kiújult daganatszövet vagy áttétes nyaki nyirokcsomó alkohollal való roncsolásával jó eredmény érhető el.

Hogy történik a beavatkozás?

Pajzsmirigy cysták alkoholos kezelésének kivitelezése:

Pajzsmirigy cysták (jóindulatú, folyadékkal telt hólyagok) esetében az alkohol kezelés célja, hogy a cysta ne telődjön vissza. Nagy cysták esetében (10 ml-nél nagyobb folyadéktartalom) esetén törvényszerű, hogy a cysta egy idő után visszatelődik. Negatív citológiai eredménnyel az első visszatelődés után elvégezhető az első alkoholos kezelés, melyet a későbbiekben ismételni kell. Irodalmi adatok szerint az öt éven túli eredményességgel elérheti akár a 90%-ot.

Pajzsmirigy daganat alkoholos kezelésének kivitelezése

1. Alkalmasság feltételeinek tisztázása

Beavatkozás előtt mérlegeljük, hogy van-e értelme a kezelésnek. Fontos, hogy a beavatkozás nagyobb előnnyel járjon, mint amennyi kockázatot hordoz magában. Áttekintjük a citológiai vizsgálat eredményét, az Ön korábbi dokumentációit. Tájékoztatás után Ön írásbeli beleegyező nyilatkozatot tölt ki.

2. Maga a kivitelezés

Először áttekintő nyaki ultrahang vizsgálatot végzünk, majd ultrahang-ellenőrzés mellett helyi érzéstelenítőt (Lidocain) fecskendezünk a bőre alá. Ezután szintén ultrahang-vezérlés mellett a daganatos elváltozásba abszolút (95-99%-os) alkoholt juttatunk. Az ultrahang-ellenőrzés lehetővé teszi, hogy az alkohol csak a daganat szövetbe jusson, ne csorogjon az ép szövetek közé. A kezelés több alkalommal történik, melyekre néhány hetente kerül sor.

3. Kontroll vizsgálatok

A több ülésben zajló beavatkozás végeztével kontroll vizsgálatokra hívjuk vissza Önt. Az ellenőrzésen való megjelenés vállalása feltétele a kezelésnek.

Előfordulhatnak-e szövődmények?

Gyakrabban előforduló panaszok:

- Kezelés közbeni fájdalom
- Kisebb vérzés a szúrás következtében
- Nyelésnél jelentkező fájdalom, nyaki érzékenység, fülbe sugárzó fájdalom
- A hang átmeneti megváltozása, rekedtség
- A bőr kistokus gyulladása a szúrás helyén

Ritkább panaszok:

- Kipirulás
- Ittasság érzése
- Nehézlégzés
- Nagyobb hematoma (vérömleny)

Irodalmi ritkaság, de előfordulhat kiújult rosszindulatú daganat kezelése esetén daganat szóródás a szúrásatorna mentén.

Amennyiben elolvasta és elfogadja a kezelés feltételeit, kérjük, töltsse ki a következő mezőket!

A beavatkozás előtt kérjük adja át friss laborleleteit!

Kérjük, jelezze a nyilatkozaton is, ha Ön véralvadásgátló kezelésben részesül vagy vérzékenységben szenved! A beavatkozás elvégzéséhez szükséges lehet ezen kezelés felfüggesztése vagy átállítása, mert a beavatkozás vérzékenység esetén súlyos szövődményhez vezethet!

Véralvadást befolyásoló gyógyszereim:

Ha cukorbetegsége van, közölje! Egyéb, rendszeresen szedett gyógyszereit nyugodtan vegye be.

Rendszeresen szedett gyógyszereim:

Feltétlenül közölje, ha foghúzás vagy műtét során érzéstelenítő injekciótól (Lidocain) rosszul lett. A beavatkozás helyét érzéstelenítjük, hogy Önnek minél kevesebb fájdalmat okozunk.

Kérjük közölje, ha bármilyen gyógyszerre, ételre, anyagra túlérzékeny, illetve ezeket jelezze a nyilatkozaton is!

A beavatkozáshoz a vizsgálandó testrészét szabaddá kell tennie. A vizsgálóasztalon speciális helyzetben kell feküdnie, kérjük, ne mozduljon el és tartsa be kollégáink utasításait, a sikeres terápiás beavatkozás érdekében.

A kezelés a járóbeteg ellátás keretein belül zajlik, hosszabb kórházi bent tartózkodást nem igényel. A vizsgálat végén rövid ideig megfigyeljük, panaszmentesség esetén otthonába távozhat. Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!

Kérdése merült fel?

Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal munkatársunkhoz. Köszönjük, hogy együttműködésével megkönnyítette munkánkat és ezzel is elősegítette saját gyógyulását!



Budapest, 2020. május

*Dr. Tárnoki Dávid László
Központvezető Főorvos*

*Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Osztályvezető Főorvos*